de

Gebrauchsanweisung

PROIBS®

Produkt zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit IBS

Die Gebrauchsanweisung muss vor dem Gebrauch sorgfältig gelesen werden, da sie wichtige Informationen für Sie enthält. Dieses Medizinprodukt ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss PROIBS® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden. Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmal lesen. Fragen Sie in der Apotheke, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apotheke.

Das Reizdarmsyndrom (IBS) ist eine verbreitete gastrointestinale Störung. Sie äußert sich in einer Gruppe von Symptomen, wie Bauchschmerzen, Blähungen und veränderten Stuhlgewohnheiten, die von Durchfall bis Verstopfung reichen. Die Pathophysiologie und Ursachen des Reizdarmsyndroms sind nicht umfassend aufgeklärt, sodass sich die Behandlung hauptsächlich auf die Linderung der mit dem Reizdarmsyndrom verbundenen Symptome konzentriert. PROIBS® ist ein zertifiziertes Medizinprodukt für die Behandlung der Symptome des Reizdarmsyndroms wie abdominale Schmerzen, Blähungen, Durchfall und/oder Verstopfung.

Zusammensetzung

Ein Stick PROIBS® enthält 250 mg AVH200® ein aus Pflanzen gewonnener Extrakt. Sonstige Bestandteile: Fruchtzucker, Inulin, Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Ascorbinsäure, Silicumdioxid, Tricalciumphosphat, Magnesiumstearat, Aroma Zitrone, Riboflavin.

Zweckbestimmung

Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit dem Reizdarmsyndrom, wie abdominale Schmerzen, Blähungen und Veränderungen des Stuhlgangs (Durchfall/Verstopfung).

Gegenanzeigen

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe, insbesondere bei Fruktose-Intoleranz, sollte das Produkt nicht angewendet werden. Diabetiker sollten das Produkt nur nach Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt anwenden, da das Produkt Zucker enthält.

Wechselwirkungen

Bisher nicht bekannt. Es wird jedoch empfohlen eine Ärztin oder einen Arzt zu konsultieren, falls zusätzliche Medikamente eingenommen werden.

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt. Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen ist die Behandlung abzubrechen. Sollten Sie wider Erwarten Nebenwirkungen bei sich beobachten, wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Deutschland, Website: www.bfarm.de und dem Hersteller melden.

Vorsichtsmaßnahmen

Besteht die Notwendigkeit zur Einnahme von Arzneimitteln, muss unbedingt vor der Einnahme des Produkts eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden. **Was müssen Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit, sowie bei Kindern beachten?** Während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt anwenden. Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren. Bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren nur nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt anwenden.

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung

Drücken Sie den Stick der Länge nach, um mögliche Klumpen oder Agglomerate zu lösen und schütten Sie den Inhalt in ein Glas Wasser (250 – 300 ml). Trinken Sie es je nach Schwere der Symptome, 1-2-mal täglich unabhängig von den Mahlzeiten. PROIBS® ist für die Langzeitanwendung geeignet. Wenn Sie es jedoch über einen längeren Zeitraum einnehmen oder wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, sollten Sie Rücksprache mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder Ihrer Apotheke halten.

Lagerungs- und Haltbarkeitshinweise

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel und dem Stick angebracht. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum.

5°C – 25°C Trocken und zwischen 5°C und 25°C lagern.

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Darreichungsform und Inhalt

10 sticks à 3 g = 30 g / 30 sticks à 3 g = 90 g

Hat Ihnen das Produkt gefallen?

Für Anregungen oder Wünsche wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Hersteller

C. Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1
33161 Hövelhof
Deutschland
www.hedenkamp.de

Vertrieb

Ardeypharm GmbH Pharmazeutische Fabrik
Loerfeldstr. 20
58313 Herdecke
Deutschland
office@ardeypharm.de

CE 0481 MD Medizinprodukt

CAPL1902DE(de)v1 - Letzte Änderung 2026-05